

Tabela 1. Consultas realizadas.

	n	%	Média (DP)	Mediana (IIQ)
Idade	464	100,0	8 (1,7)	8 (7,9)
Sexo				
Feminino	225	48,5		
Masculino	239	51,5		
Com óculos				
Sim	21	4,5		
Não	443	95,5		
Acuidade triagem OD				
Alterado	78	16,8		
Normal	378	81,5		
Não fez	8	1,7		
Acuidade triagem OE				
Alterado	68	14,7		
Normal	388	83,6		
Não fez	8	1,7		
Acuidade triagem				
Sem alteração	356	76,7		
Unilateral	54	11,6		
Bilateral	46	9,9		
Não fez	8	1,7		
Alteração teste de cover triagem				
Alterado	12	2,6		
Normal	448	96,6		
Não fez	4	0,9		
Alteração rotações binoculares				
Alterado	10	2,2		
Normal	450	97,0		
Não fez	4	0,9		
Alterações na triagem oftalmológica				
Alterado	115	24,8		
Normal	341	73,5		
Não fez	8	1,7		
Situação de consulta com oftalmologista				
Presente	99	21,3		
Ausente	31	6,7		
Não precisou	334	72,0		

Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. DP – Desvio Padrão. IIQ – Intervalo Interquartil.

Tabela 2. Testes.

	n	%
Cover		
Alterado	10	10,1
Normal	82	82,8
Não fez	7	7,1
Rotações Binoculares		
Alterado	1	1,0
Normal	91	91,9
Não fez	7	7,1
Biomicroscopia OD		
Alterado	2	2,0
Normal	94	94,9
Não fez	3	3,0

Biomicroscopia OE		
Alterado	1	1,0
Normal	95	96,0
Não fez	3	3,0
Fundoscopia OD		
Alterado	2	2,0
Normal	94	94,9
Não fez	3	3,0
Fundoscopia OE		
Alterado	2	2,0
Normal	94	94,9
Não fez	3	3,0
Precisa de óculos		
Sim	57	57,6
Não	39	39,4
Não avaliado	3	3,0
Alterações na consulta oftalmológica		
Alterado	58	58,6
Normal	38	38,4
Não fez	3	3,0

Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual.

Tabela 3. Triagem Oftalmológica.

	Alterações na consulta Oftalmológica		valor-p
	Sim n (%)	Não n (%)	
Sexo			
Feminino	28 (48,3)	21 (55,3)	0,537 ^F
Masculino	30 (51,7)	17 (44,7)	
Com óculos			
Sim	6 (10,3)	0 (0,0)	0,078 ^F
Não	52 (89,7)	38 (100)	
Acuidade Triagem OD			
Alterado	36 (65,5)	23 (62,2)	0,644 ^M
Normal	19 (34,5)	14 (37,8)	
Acuidade Triagem OE			
Alterado	34 (61,8)	19 (51,4)	0,875 ^M
Normal	21 (38,2)	18 (48,6)	
Acuidade triagem			
Sem alteração	7 (12,7)	8 (21,6)	0,581 ^Q
Unilateral	26 (47,3)	16 (43,2)	
Bilateral	22 (40)	13 (35,1)	
Alteração teste de cover triagem			
Alterado	3 (5,2)	3 (7,9)	<0,001 ^M
Normal	55 (94,8)	35 (92,1)	
Alteração rotações binoculares			
Alterado	4 (6,9)	2 (5,3)	<0,001 ^M
Normal	54 (93,1)	36 (94,7)	
Alteração na triagem oftalmológica			
Alterado	52 (94,5)	32 (86,5)	<0,001 ^M
Normal	3 (5,5)	5 (13,5)	

Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. F – Teste Exato de Fisher. M – Teste de McNemar. Q – Teste Qui-Quadrado de Pearson.

Tabela 4. Acuidade pós consulta olho direito.

	Acuidade Triagem OD		valor-p
	Alterado n (%)	Normal n (%)	
Acuidade Pós Consulta OD			
Alterado	3 (6,1)	0 (0,0)	<0,001
Normal	46 (93,9)	29 (100)	

Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. Teste de McNemar.

Tabela 5. Reprodutibilidade do Teste de Acuidade olho esquerdo.

	Acuidade Triagem OE		valor-p
	Alterado n (%)	Normal n (%)	
Acuidade Pós Consulta OE			
Alterado	3 (7)	1 (2,9)	<0,001
Normal	40 (93)	34 (97,1)	

Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. Teste de McNemar.

Tabela 6. Reprodutibilidade do Teste de Acuidade olho esquerdo ambos os olhos.

	Acuidade Triagem			valor-p
	Sem alteração n (%)	Unilateral n (%)	Bilateral n (%)	
Acuidade Pós Consulta				
Sem alteração	15 (100)	33 (97,1)	26 (89,7)	<0,001
Unilateral	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (3,4)	
Bilateral	0 (0,0)	1 (2,9)	2 (6,9)	

Legenda: n – frequência absoluta. % – frequência relativa percentual. Teste de McNemar-Bowker.